

# 慢性疼痛の治療で

## トアラセット配合錠「杏林」を服用される患者さまへ

トアラセット配合錠「杏林」は、**慢性疼痛**のお薬です。



このお薬 **トアラセット 杏林** には、鎮痛作用のある**トラマドール**、**アセトアミノフェン**が配合されています。トラマドールまたはアセトアミノフェンを含む他のお薬（市販のかぜ薬、解熱鎮痛薬などにも含まれていることがあります。）と一緒に服用しないでください。他のかぜ薬や解熱鎮痛薬を使用している場合は医師・薬剤師にお伝えください。

### 服用にあたってのご注意

- このお薬は、1回1錠、1日4回が基本ですが、医師の指示通りに服用してください。
- 症状に応じて適宜増減されることもありますが、1回2錠、1日8錠を超えて服用してはいけません。  
服用間隔：4時間以上空けてください。  
※重篤な肝障害がおこることがあるので、1日4錠を超える高用量で長期間服用する場合には、定期的に肝機能検査が行われます。
- 誤って多く服用した場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

● ● ● ● ● 飲み忘れた場合の対応 ● ● ● ● ●

飲み忘れに気づいた場合は、できるだけ早く服用してください。  
ただし、次の服用時間に近い場合は、忘れた分は服用せず、1回とはして次回から服用するようにしてください。  
**絶対に2回分をまとめて一度に服用しないでください。**

- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の判断で量や回数を変更したり、服用を中止しないでください。
- 飲酒は避けてください。飲酒により薬の作用や副作用が強まる場合があります。

## 保管について

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- **他の人には絶対に渡さないでください。**
- **余ったお薬は廃棄してください。**

## 副作用について

**吐き気・嘔吐** 飲み始めのころにあらわれることがあります。  
3～7日程度で耐性が形成され、制吐剤の投与が必要でなくなることが多いです。なかなか症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。

**眠気** 飲み始めのころにあらわれることがあります。  
3～5日程度で耐性が形成され、なくなることが多いですが、眠気がとれない場合は医師にご相談ください。

服用中は自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。



**便秘** 便秘が認められる場合は、医師にご相談ください。  
便秘の対策として、下剤と一緒に服用していただくことがあります。

お薬についてわからないこと、服用中に気になることがあれば、医師または薬剤師にご相談ください。

キョーリンリメディオ株式会社

